




Рис. 2. Влияние SKF-96365 (20,0 мкмоль/л), YM-58483 (1,0 мкмоль/л), ВСТС (0,2 мкмоль/л), бетулиновой кислоты (БА; 60,0 мкмоль/л) и ее комбинаций с указанными препаратами на рост клеток глиомы С6 ($n = 8$) (а) и HeLa ($n = 8$) (б). Данные получены с использованием МТТ-теста. Знаком * отмечены достоверные различия по отношению к контролю, знаком ** – достоверные различия по отношению к действию SKF-96365 или ВСТС, знаком *** – достоверные различия по отношению к действию бетулиновой кислоты ($p < 0,05$; тест Манна – Уитни)

Fig. 2. The effect of SKF-96365 (20.0 $\mu\text{mol/L}$), YM-58483 (1.0 $\mu\text{mol/L}$), BCTC (0.2 $\mu\text{mol/L}$), betulinic acid (BA; 60.0 $\mu\text{mol/L}$) and its combinations with these drugs on the growth of C6 glioma ($n = 8$) (a) and HeLa ($n = 8$) (b) cells. Data obtained using the MTT test. Sign * indicates significant differences compared to the control, sign ** – significant differences compared to the effect of SKF-96365 or BCTC, sign *** – significant differences compared to the effect of betulinic acid ($p < 0.05$; Mann – Whitney test)