

a/a

б/б





Рис. 6. Влияние хлорпромазина (CPZ; 14,0 мкмоль/л), циклоспорина А (CS; 2,0 мкмоль/л), производного бетулиновой кислоты (BAD; 4,0 мкмоль/л (а) и 8,0 мкмоль/л (б)) и его комбинаций с указанными препаратами на рост клеток HeLa ($n = 16$ (а), $n = 4$ (б)). Данные получены с использованием МТТ-теста. Знаком * отмечены достоверные различия по отношению к контролю, знаком ** – достоверные различия по отношению к действию хлорпромазина или циклоспорина А, знаком *** – достоверные различия по отношению к действию производного бетулиновой кислоты ($p < 0,05$; тест Манна – Уитни)

Fig. 6. The effect of chlorpromazine (CPZ; 14.0 $\mu\text{mol/L}$), cyclosporine A (CS; 2.0 $\mu\text{mol/L}$), a betulinic acid derivative (BAD; 4.0 $\mu\text{mol/L}$ (a) and 8.0 $\mu\text{mol/L}$ (b)) and its combinations with these drugs on the growth of HeLa cells ($n = 16$ (a), $n = 4$ (b)). Data obtained using the MTT test. Sign * indicates significant differences compared to the control, sign ** – significant differences compared to the effect of chlorpromazine or cyclosporine A, sign *** – significant differences compared to the effect of a betulinic acid derivative ($p < 0.05$; Mann – Whitney test)