




Рис. 5. Подвижность клеток штаммов *E. amylovora* E2 и *E. amylovora* E2  $\Delta bssS$  на минимальной среде M9, содержащей глицерин (а) или глюкозу (б) в качестве источника углерода (U-критерий Манна – Уитни).

Знаком \* обозначено отсутствие достоверных различий ( $p > 0,05$ ), знаком \*\* отмечены достоверные различия при  $p < 0,01$ , а знаком \*\*\* – достоверные различия при  $p < 0,001$ . Фотографии бактериальных макроколоний спустя 48 ч инкубации при температуре 28 °C на минимальной среде M9 с добавлением глицерина (в) или глюкозы (г)

Fig. 5. Swimming motility for *E. amylovora* E2 and *E. amylovora* E2  $\Delta bssS$  cells in M9 minimal medium containing glycerol (a) or glucose (b) as a carbon source (Mann – Whitney U-test).

The sign \* indicates the absence of significant differences ( $p > 0.05$ ), the sign \*\* indicates significant differences at  $p < 0.01$ , and the sign \*\*\* indicates significant differences at  $p < 0.001$ .

Macrocolonies of *E. amylovora* E2 and *E. amylovora* E2  $\Delta bssS$  strains on the plate containing M9 minimal medium with glycerol (c) or glucose (d).

Photographs were taken 48 h after inoculation at a temperature of 28 °C