




Рис. 3. Влияние SKF-96365 (20,0 мкмоль/л), BCTC (1,0 мкмоль/л), производного бетулиновой кислоты (BAD; 4,0 и 8,0 мкмоль/л) и его комбинаций с указанными препаратами на рост клеток глиомы С6 ($n = 4$) (а) и HeLa ($n = 4$) (б). Данные получены с использованием МТТ-теста. Знаком * отмечены достоверные различия по отношению к контролю, знаком ** – достоверные различия по отношению к действию SKF-96365 или BCTC, знаком *** – достоверные различия по отношению к действию производного бетулиновой кислоты ($p < 0,05$; тест Манна – Уитни)

*Fig. 3. The effect of SKF-96365 (20.0 $\mu\text{mol/L}$), BCTC (1.0 $\mu\text{mol/L}$), a betulinic acid derivative (BAD; 4.0 and 8.0 $\mu\text{mol/L}$) and its combinations with these drugs on the growth of C6 glioma ($n = 4$) (a) and HeLa ($n = 4$) (b) cells. Data obtained using the MTT test. Sign * indicates significant differences compared to the control, sign ** – significant differences compared to the effect of SKF-96365 or BCTC, sign *** – significant differences compared to the effect of a betulinic acid derivative ($p < 0.05$; Mann – Whitney test)*