




Рис. 5. Влияние хлорпромазина (CPZ; 14,0 мкмоль/л), циклоспорина А (CS; 2,0 мкмоль/л), производного бетулиновой кислоты (BAD; 4,0 и 8,0 мкмоль/л) и его комбинаций с указанными препаратами на рост клеток глиомы С6 ($n = 12$). Данные получены с использованием МТТ-теста.

Знаком * отмечены достоверные различия по отношению к контролю, знаком ** – достоверные различия по отношению к действию хлорпромазина или циклоспорина А, знаком *** – достоверные различия по отношению к действию производного бетулиновой кислоты ($p < 0,05$; тест Манна – Уитни)

Fig. 5. The effect of chlorpromazine (CPZ; 14.0 $\mu\text{mol/L}$), cyclosporine A (CS; 2.0 $\mu\text{mol/L}$), a betulinic acid derivative (BAD; 4.0 and 8.0 $\mu\text{mol/L}$) and its combinations with these drugs on the growth of C6 glioma cells ($n = 12$). Data obtained using the MTT test.

Sign * indicates significant differences compared to the control, sign ** – significant differences compared to the effect of chlorpromazine or cyclosporine A, sign *** – significant differences compared to the effect of a betulinic acid derivative ($p < 0.05$; Mann – Whitney test)