




Рис. 4. Петрографический состав гравия (фракция 0,5–1,0 см) и гальки (фракция 1,0–10,0 см) в ясельдинской морене Беларуси:

- 1 – диаграмма и шкала процентного содержания гравия и гальки различных петрогенетических групп;
 2 – магматические и метаморфические породы; 3 – терригенные породы девона;
 4 – девонские доломиты; 5 – палеозойские известняки; 6 – мезозойские карбонатные и прочие породы;
 7 – граница ясельдинского оледенения; 8 – ледоразделы потоков и лопастей;
 9 – пункты изучения петрографического состава морены.
 Ледниковые потоки: I – Неманский; II – Днепровский; III – Остерский
 (составлено на основе данных работ [54; 55])

Fig. 4. Petrographic composition of gravel (fraction 0.5–1.0 cm) and pebbles (fraction 1.0–10.0 cm) in the Yaselda moraine of Belarus:

- 1 – diagram and scale of the percentage content of gravel and pebbles of various petrogenetic groups;
 2 – igneous and metamorphic rocks; 3 – Devonian terrigenous rocks; 4 – Devonian dolomites;
 5 – Paleozoic limestones; 6 – Mesozoic carbonate and other rocks; 7 – boundary of the Yaselda glaciation;
 8 – ice divides of streams and lobes; 9 – points for studying the petrographic composition of the moraine.
 Glacial streams: I – Neman; II – Dnieper; III – Oster
 (compiled on the basis of data from works [54; 55])