




Рис. 5. Ассоциации руководящих минералов в ясельдинской морене Беларуси:  
 1 – диаграмма и шкала процентного содержания минералов во фракции 0,10–0,25 мм;  
 2 – ильменит; 3 – гранат; 4 – амфибол; 5 – доломит; 6 – циркон;  
 7 – эпидот; 8 – пирит; 9 – сидерит; 10 – фосфат; 11 – лейкоксен;  
 12 – граница ясельдинского оледенения; 13 – ледоразделы потоков и лопастей;  
 14 – пункты изучения минералогического состава морены.  
 Ледниковые потоки: I – Неманский; II – Днепровский; III – Остерский  
 (составлено на основе данных работ [58–65])

Fig. 5. Associations of indicator minerals in the Yaselda moraine of Belarus:  
 1 – diagram and scale of the percentage content of minerals in the fraction 0.10–0.25 mm;  
 2 – ilmenite; 3 – garnet; 4 – amphibole; 5 – dolomite; 6 – zircon;  
 7 – epidote; 8 – pyrite; 9 – siderite; 10 – phosphate; 11 – leucoxene;  
 12 – boundary of the Yaselda glaciation; 13 – ice divides of streams and lobes;  
 14 – points for studying the mineralogical composition of the moraine.  
 Glacial streams: I – Neman; II – Dnieper; III – Oster  
 (compiled on the basis of data from works [58–65])