




Рис. 2. Расположение основных морфогенетических типов березинских ледниковых ложбин и впадин:

- 1 – ложбины ледниковой экзарации; 2 – ложбины ледникового выдавливания;
 3 – субгляциальные водно-эрозионные ложбины; 4–9 – врезы полигенетического происхождения
 (4 – ложбины ледниковой экзарации и выдавливания, 5 – экзарационно-эрозионные ложбины,
 6 – ложбины ледниковой экзарации, выдавливания и размыва, 7 – впадины ледниковой экзарации и размыва,
 8 – впадины ледниковой экзарации и выдавливания, 9 – впадины ледниковой экзарации, выдавливания и размыва);
 10 – граница березинского оледенения; 11 – граница минской стадии;
 12 – границы фаз (I – заславской, II – мядельской) и осцилляций

Fig. 2. Location of the main morphogenetic types of the Berezina glacial valleys and basins:

- 1 – glacial exaration valleys; 2 – glacial extrusion valleys; 3 – tunnel valleys; 4–9 – incisions of a polygenetic origin
 (4 – valleys of glacial exaration and extrusion, 5 – exaration-erosion valleys,
 6 – valleys of glacial exaration, extrusion and erosion, 7 – basins of glacial exaration and erosion,
 8 – basins of glacial exaration and extrusion, 9 – basins of glacial exaration, extrusion and erosion);
 10 – Berezina glaciation boundary; 11 – Minsk stage boundary;
 12 – boundaries of phases (I – Zaslavl, II – Myadel) and oscillations